



ජෛව විද්‍යා විද්‍යා මණ්ඩලය

ගොදුරු වත්තන්

ලදරුවන්
මුල් ළමාවියේ
දරුවන්
වැළඳීමේ වැඩි
අවදානමක් ඇත

- පසු ළමාවියේ දරුවන්
- නව යොවුන් දරුවන්
- ගර්භණී කාන්තාවන්
- ක්ෂීරණ මව්වරුන්

ඇති වීමට හේතු

- ශරීරයට අවශ්‍ය මහා පෝෂක ජරමාණුවක් ලෙස දිගු කලක් නොලැබීයාම ජරධාන ම හේතුව වේ.
- අයහපත් ආර්ථිකය
- නුගත්කම
- නොසැලකිලිමත් බව
- පෝෂණය පිළිබඳ යහපත් ආකල්ප හා නිසි දැනුමක් නොමැත වීම.
- යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය නොකිරීම.
- සෞඛ්‍ය සේවා නිසි ලෙස නොලැබීයාම.
- දැරුවත් අතර වයස් පරතරය අඩු වීම.
- යොවුන් විශේෂී ගැබ් ගැනීම.

උනතා තක්ක්වය පෙන්වන දර්ශක

- මිටි බව - වයසට සරිලන උස නොමැති වීම
- ක්ෂය වීම - උසට සරිලන බර නොමැති වීම
- වයසට සරිලන බර නොමැති වීම

ජිරෝටින් ගැනීම මන්දපෝෂණයේ උග්‍ර තීව්‍ර අවස්ථා දෙකකි.

- ක්වොෂියෝකෝර්
- මැරස්මස්

ක්වෘෂියෝකෝර්



පිෂ්ඨමට ආහාර ජීර්මාණාත්මකව ලැබුණ ද එම ආහාර වල සිරුරට අවශ්‍ය කරන ජීරෝටීන් උණ වීම ක්වොසියෝකෝර් ඇති වීමට හේතු වේ.

රෝග ලක්ෂණ

- ඉදිමාව (රුධිරයේ ඇති ඇල්බියුමින් හා හිමෝග්ලොබින් ජීර්මාණය අඩු වේ. රුධිරයේ අඩංගු ජීරෝටීන් සාන්ද්‍රණය අන්තර් සෛලීය සාන්ද්‍රණයට වඩා අඩු වීම නිසා රුධිරයේ ඇති ජලය අන්තර් සෛලීය තරලයේ අඩංගු ජීරෝටීන තරලයට එක් වීම නිසා)
- උදාසීන ස්වභාවයක් ගනියි.
- සමෙහි ආසාදන ඇති වේ.
- හිස් කෙස් තඹ පැහැති වී පහසුවෙන් කැඩී යයි.

මරණමය



ආහාර වල සියලුම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ දීර්ඝකාලීනව අඩුවෙන් ලැබීම නිසා මැරස්මස් ඇති වේ.

රෝග ලක්ෂණ

- ශරීරයට කෘශ වේ.
- මහළු පුද්ගලයකුගේ ස්වරූපය ගනියි.
- මේද තැන්පතුව අඩු වීමෙන් සහ රුලි වැටේ.
- උදාසීන ස්වභාවයක් ගනී.
- නොරිස්සුම් ගතියෙන් යුක්තය.
- හිස් කෙස් අඩුවන අතර සාමාන්‍ය පැහැයෙන් යුක්තය.

වැළකීමට නම්....

- ළදරුවන්ට මුල් මාස හයේ මව් කිරි පමණක් ලබා දීම.
- පෝෂණය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
- ජර්මාණාත්මක හා ගුණාත්මක බවින් යුතු අතිරේක ආහාර සැපයීම.
- ගැබ්ණි හා කිරි දෙන මවුවරුන් සායනවලට සහභාගී වීම උනන්දු කරවීම.
- ආසාදන රෝග මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම.
- ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම.
- ජර්නිශක්තිකරණ ලබාදීම.
- පණු ආසාදන ඇති විට පණු ජර්නිකාර ලබා දීම.
- ළමුන්ට සුදුසු, මිල අඩු, පෝෂ්‍යදායී, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආහාර ජර්වලිත කිරීම.
- අඩු ආදායම් ලබන අඩු පෝෂණ තත්ත්ව ඇති අය හඳුනා ගෙන පෝෂණ පරිපූරක ලබා දීම හා ඒවා නිවැරදිව ආහාරයට ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වීම.